

4. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

К нелинейным уравнениям относятся алгебраические и трансцендентные уравнения.

Алгебраическими уравнениями называются уравнения, которые можно преобразовать так, чтобы в левой части будет многочлен от неизвестных, а в правой – нуль, т.е. $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$, где a_i – коэффициенты (числа); n – степень многочлена.

Уравнения, содержащие другие функции (тригонометрические, показательные, логарифмические и др.), называются **трансцендентными**.

Примеры трансцендентных уравнений:

$$\sin(2x) \frac{5x+3}{0,5} - \operatorname{tg}(3x) = 0, \quad e^{-x} + 6 \log_2(5 - x) + 6 \sin(x) = 0.$$

4.1. Метод простых итераций


Для построения схемы интеграций систему уравнений (4.1) представим в виде

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\begin{cases} x_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ x_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots\dots\dots \\ x_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad (4.2)$$

т.е. из каждого уравнения выразим по одной переменной x_i .

Первый этап решения СНУ – отделение корней, т.е. нахождения областей D_k (k – число корней системы), в которых система имеет только одно решение.



Второй этап – уточнение корня.

Начальное приближение корней $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ выбирают из области D_k . Подставляя эти значения в правую часть (4.2) получим следующие приближения переменных $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}$:

$$\begin{cases} x_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ x_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots \\ x_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad (4.2)$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}), \\ x_2^{(1)} = f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}), \\ x_3^{(1)} = f_3(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \dots \\ x_n^{(1)} = f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}), \end{cases}$$

которые используются для получения 2-го приближения неизвестных и т.д.

Таким образом, схема итераций метода простых интегриций имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^{(k+1)} = f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)} \dots, x_n^{(k)}), \\ x_2^{(k+1)} = f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)} \dots, x_n^{(k)}), \\ x_3^{(k+1)} = f_3(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)} \dots, x_n^{(k)}) \\ \dots\dots\dots \\ x_n^{(k+1)} = f_n(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)} \dots, x_n^{(k)}), \end{array} \right. \quad (4.3)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots$

Для более быстрой сходимости итерационного процесса, начальное приближение следует выбирать достаточно близким к точному значению корня.

Условия остановки процесса итераций:

$$\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon \quad \text{или} \quad \max_i |f(x_i^{(k+1)})| < \varepsilon,$$

где $i = \overline{1, n}, k = 0, 1, 2, \dots$

Для сходимости системы процесса итераций достаточно, чтобы в области уточнения D_k выполнялось одно из следующих условий:

$$1) \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| < 1;$$

$$2) \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| < 1;$$

$$3) \sqrt{\sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)^2} < 1.$$

Эти условия получаются аналогично таковым в методах простых итераций и Зейделя при решении СЛАУ.

Достаточные условия сходимости для решения СЛАУ методами простых итераций и Зейделя:

$$1) a = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}| < 1; \quad (2.35)$$

$$2) a = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}| < 1; \quad (2.36)$$

$$3) a = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^2} < 1. \quad (2.37)$$

Пример 1. Используя метод простых итераций, решить следующую систему нелинейных уравнений с точностью до 0,001.

$$\begin{cases} \sin(x - 0,5) - y = 1,5; \\ 2x - \cos y = 0,6. \end{cases}$$

Решение.

Перепишем данную систему в виде

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos y + 0,3; \\ y = \sin(x - 0,5) - 1,5. \end{cases}$$

(из первого второго уравнения выразили x , из первого – y)

Отделение корней произведем графически (рис. 4.1). Из графика видно, что система имеет одно решение, заключенное в области D : $0 < x < 0,25$; $-2 < y < -1,5$.




Рис. 4.1. Графическое отделение корней

Убедимся в том, что метод простых итераций применим для уточнения решения системы, для чего запишем ее в следующем виде:

$$\begin{cases} x = f_1(x, y) = \frac{1}{2} \cos y + 0,3; \\ y = f_2(x, y) = \sin(x - 0,5) - 1,5; \end{cases}$$

В области $D \{0 < x < 0,25; -2 < y < -1,5\}$ имеем

$$\left| \frac{\partial f_1}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial f_2}{\partial y} \right| = \left| -\frac{1}{2} \sin y \right| \leq 0,5 < 1,$$

т.е. условие сходимости выполняется. Следовательно, в этой области D , для уточнения корней можно использовать схему:

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = \frac{1}{2} \cos y^{(k)} + 0,3; \\ y^{(k+1)} = \sin(x^{(k)} - 0,5) - 1,5. \end{cases}$$

За начальные приближения примем $x^{(0)} = 0,13$, $y^{(0)} = -1,8$.

Достаточные условия сходимости для решения СНУ методами простых итераций:

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| < 1;$$

$$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| < 1;$$

$$\sqrt{\sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)^2} < 1$$

Результаты представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Номер итерации, k	Приближение корня		Проверка условия:	Проверка условия:
	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$ x^{(k)} - x^{(k-1)} < \varepsilon = 0,001$	$ y^{(k)} - y^{(k-1)} < \varepsilon = 0,001$
0	0,13	-1,8		
1	0,186399	-1,86162	не выполняется	не выполняется
2	0,156631	-1,80849	не выполняется	не выполняется
3	0,182271	-1,83666	не выполняется	не выполняется
4	0,168628	-1,81241	не выполняется	не выполняется
5	0,180365	-1,82534	не выполняется	не выполняется
6	0,174098	-1,81422	не выполняется	не выполняется
7	0,179487	-1,82016	не выполняется	не выполняется
8	0,176605	-1,81505	не выполняется	не выполняется
9	0,179082	-1,81779	не выполняется	не выполняется
10	0,177756	-1,81544	не выполняется	не выполняется
11	0,178896	-1,8167	не выполняется	не выполняется
12	0,178286	-1,81561	выполняется	не выполняется
13	0,17881	-1,81619	выполняется	выполняется

2.2. Метод Зейделя

Метод Зейделя представляет собой модификацию метода простых итераций. Он используется для решения СЛУ (4.1). Систему (4.1) необходимо сначала привести к виду (4.2). Начальное приближение корней $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ выбирают из области D_k , содержащей один корень. Тогда итерации методом Зейделя выполняются по следующей схеме:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \\ x_2^{(k+1)} = f_2(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \\ x_3^{(k+1)} = f_3(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ \dots \\ x_n^{(k+1)} = f_n(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, x_3^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k)}), \end{cases} \quad (4.4)$$

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \end{cases} \quad (4.1)$$

где $F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – нелинейные уравнения ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$\begin{cases} x_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ x_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots \\ x_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad (4.2)$$

Схема метода простых итераций

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \\ x_2^{(k+1)} = f_2(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \\ x_3^{(k+1)} = f_3(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, x_3^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ \dots \\ x_n^{(k+1)} = f_n(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, x_3^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k)}), \end{cases} \quad (4.3)$$

Условия остановки процесса итераций совпадают с таковыми при использовании метода простых итераций, а именно:

$$\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon \quad \text{или} \quad \max_i |f(x_i^{(k+1)})| < \varepsilon,$$

где $i = \overline{1, n}$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

Для сходимости системы процесса итераций достаточно, чтобы в области уточнения D_k выполнялось одно из следующих условий:

$$4) \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| < 1;$$

$$5) \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| < 1;$$

$$6) \sqrt{\sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)^2} < 1.$$

Пример 2. Решить систему примера 1, используя метод Зейделя, с точностью до 0,001.

Решение. Так как в примере 1 этапы отделения корней и приведения системы к виду удобному для итераций были выполнены, сразу запишем схему итераций по методу Зейделя:

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = \frac{1}{2} \cos y^{(k)} + 0,3; \\ y^{(k+1)} = \sin(x^{(k+1)} - 0,5) - 1,5. \end{cases}$$

Как и в примере 1, за начальные приближения примем $x^{(0)} = 0,13$, $y^{(0)} = -1,8$. Вычисления приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Номер итерации, k	Приближение корня		Проверка условия:	Проверка условия:
	x_k	y_k	$ x^{(k)} - x^{(k-1)} < \varepsilon = 0,001$	$ y^{(k)} - y^{(k-1)} < \varepsilon = 0,001$
0	0,13	-1,8		
1	0,186399	-1,80849	не выполняется	не выполняется
2	0,182271	-1,81241	не выполняется	не выполняется
3	0,180365	-1,81422	не выполняется	не выполняется
4	0,179487	-1,81505	выполняется	выполняется

2.3. Метод Ньютона

Пусть требуется решить систему нелинейных уравнений (СНУ) вида:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

Метод Ньютона решения системы (4.1) состоит в построении итерационной последовательности:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = x_1^{(k-1)} + \Delta x_1^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = x_2^{(k-1)} + \Delta x_2^{(k-1)}, \\ \dots\dots\dots \\ x_n^{(k)} = x_n^{(k-1)} + \Delta x_n^{(k-1)}. \end{cases} \quad (4.5)$$

Для нахождения неизвестных $\Delta x_i^{(0)}, \Delta x_i^{(1)}, \dots, \Delta x_i^{(k-1)}$ воспользуемся разложением функций $F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в ряд Тейлора в окрестности начального приближения.

Такое разложение для рассматриваемых функций в окрестности точки $x^{(0)}$ с координатами $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ имеет вид:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = x_1^{(k-1)} + \Delta x_1^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = x_2^{(k-1)} + \Delta x_2^{(k-1)}, \\ \dots \\ x_n^{(k)} = x_n^{(k-1)} + \Delta x_n^{(k-1)}. \end{cases} \quad (4.5)$$

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x^{(0)}) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^{(0)}) + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x^{(0)}) + \dots + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^{(0)}) + R_1, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_2(x^{(0)}) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x^{(0)}) + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x^{(0)}) + \dots + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(x^{(0)}) + R_2, \\ \dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_n(x^{(0)}) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x^{(0)}) + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial F_n}{\partial x_2}(x^{(0)}) + \dots + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x^{(0)}) + R_n, \end{cases} \quad (4.6)$$

С учетом (4.1), и пренебрегая остаточными членами R_i , получаем СЛАУ с неизвестными $\Delta x_i^{(0)}$:

$$\left\{ \begin{array}{l}
 F_1(x^{(0)}) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^{(0)}) + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x^{(0)}) + \dots + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^{(0)}) = 0, \\
 F_2(x^{(0)}) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x^{(0)}) + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x^{(0)}) + \dots + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(x^{(0)}) = 0, \\
 \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\
 F_n(x^{(0)}) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x^{(0)}) + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial F_n}{\partial x_2}(x^{(0)}) + \dots + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x^{(0)}) = 0,
 \end{array} \right. \quad (4.7)$$

или, перенеся свободные коэффициенты $F_i(x^{(0)})$ вправо, получим следующую

СЛАУ для вычисления $\Delta x_i^{(0)}$:

По найденным приращениям $\Delta x_i^{(0)}$ и координатам нулевого приближения по схеме (4.5) находятся значения первых приближений переменных:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = x_1^{(k-1)} + \Delta x_1^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = x_2^{(k-1)} + \Delta x_2^{(k-1)}, \\ \dots \\ x_n^{(k)} = x_n^{(k-1)} + \Delta x_n^{(k-1)}. \end{cases} \quad (4.5)$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(0)}, \\ x_2^{(1)} = x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(0)}, \\ \dots \\ x_n^{(1)} = x_n^{(0)} + \Delta x_n^{(0)}. \end{cases}$$

которые используются для вычислений следующих приращений $\Delta x_i^{(1)}$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) & \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) & \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) & \frac{\partial F_n}{\partial x_2}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(1)} \\ \Delta x_2^{(1)} \\ \dots \\ \Delta x_n^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_1(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \\ -F_2(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \\ \dots \\ -F_n(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \end{bmatrix}$$

и т.д.

Таким образом, $(k-1)$ -е приращения $\Delta x_i^{(k-1)}$ находятся для каждой итерации

из соответствующей системы линейных уравнений вида:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \frac{\partial F_n}{\partial x_2}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(k-1)} \\ \Delta x_2^{(k-1)} \\ \dots \\ \Delta x_n^{(k-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_1(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ -F_2(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \dots \\ -F_n(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \end{bmatrix},$$

которые подставляются в систему (4.5):

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = x_1^{(k-1)} + \Delta x_1^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = x_2^{(k-1)} + \Delta x_2^{(k-1)}, \\ \dots \\ x_n^{(k)} = x_n^{(k-1)} + \Delta x_n^{(k-1)}, \end{cases}$$

тем самым вычисляются значения k -х приближений неизвестных: $x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$.

Счет прекращается, если выполняется условие: $\max_i |\Delta x_i| < \varepsilon$.

Пример 3. Используя метод Ньютона, решить следующую систему нелинейных уравнений с точностью до 0,001.

$$\begin{cases} \sin(x - 0,5) - y = 1,5; \\ 2x - \cos y = 0,6. \end{cases}$$

Решение. Перепишем данную систему в виде

$$\begin{cases} F_1(x, y) = \sin(x - 0,5) - y - 1,5; \\ F_2(x, y) = 2x - \cos y - 0,6. \end{cases}$$

Сначала необходимо вычислить частные производные функций $F_1(x, y)$ и $F_2(x, y)$ по всем переменным:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = \cos(x - 0,5), \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial F_2}{\partial y} = -\sin y.$$

В качестве начальных приближений корней зададим следующие: $x^{(0)}=0,13$, $y^{(0)}=-1,8$.

Тогда следующие приближения будут вычисляться схеме:

$$\begin{cases} x^{(k)} = x^{(k-1)} + \Delta x^{(k-1)}, \\ y^{(k)} = y^{(k-1)} + \Delta y^{(k-1)}, \end{cases} \text{ где } k = 0, 1, \dots$$

А приращения будут находиться из систем вида:

$$\begin{bmatrix} \cos(x^{(k)} - 0,5) & -1 \\ 2 & -\sin(y^{(k)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x^{(k)} \\ \Delta y^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(\sin(x^{(k)} - 0,5) - y^{(k)} - 1,5) \\ -(2x^{(k)} - \cos y^{(k)} - 0,6) \end{bmatrix},$$

где k – номер приближения.

Результаты вычислений в следующей таблице.

Таблица 3

k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$\Delta x^{(k)}$	$\Delta y^{(k)}$
0	0,13	-1,8	0,059424	-0,00621
1	0,189424	-1,80621	-0,00436	-0,00346
2	0,18506	-1,80968	-0,00229	-0,00222
3	0,18277	-1,81189	-0,00147	-0,00141
4	0,181301	-1,81331	-0,00093	-0,0009
5	0,180366	-1,8142		

Итерации были прекращены, когда выполнилось условие

$$\max\{\Delta x^{(k)}, \Delta y^{(k)}\} < 0,001.$$

2.4. Модифицированный метод Ньютона

Пусть требуется решить систему нелинейных уравнений (СНУ) вида:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

При решении СНУ (4.1) с помощью модифицированного метода Ньютона также состоится итерационная последовательность, получаемая из схемы:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = x_1^{(k-1)} + \Delta x_1^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = x_2^{(k-1)} + \Delta x_2^{(k-1)}, \\ \dots\dots\dots \\ x_n^{(k)} = x_n^{(k-1)} + \Delta x_n^{(k-1)}. \end{cases} \quad (4.5)$$

Схема нахождения приращений переменных методом Ньютона

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \frac{\partial F_n}{\partial x_2}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(k-1)} \\ \Delta x_2^{(k-1)} \\ \dots \\ \Delta x_n^{(k-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_1(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ -F_2(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \dots \\ -F_n(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \end{bmatrix}$$

В отличие от метода Ньютона в модифицированном методе при определении $\Delta x_i^{(k-1)}$ используется схема, у которой матрица при неизвестных остается постоянной – значения всех частных производных находятся только в точке $x^{(0)}$:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) & \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) & \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) & \frac{\partial F_n}{\partial x_2}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(k-1)} \\ \Delta x_2^{(k-1)} \\ \dots \\ \Delta x_n^{(k-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_1(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ -F_2(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \\ \dots \\ -F_n(x_1^{(k-1)}, \dots, x_n^{(k-1)}) \end{bmatrix}.$$

Счет прекращается, если выполняется условие: $\max_i |\Delta x_i| < \varepsilon$.

Модифицированный метод Ньютона сходится медленнее, чем метод Ньютона.

Пример 4. Используя модифицированный метод Ньютона, решить следующую систему нелинейных уравнений с точностью до 0,001.

$$\begin{cases} \sin(x - 0,5) - y = 1,5; \\ 2x - \cos y = 0,6. \end{cases}$$

Решение. Приращения переменных, согласно методу, будем находить по схеме:

$$\begin{bmatrix} \cos(x^{(0)} - 0,5) & -1 \\ 2 & -\sin(y^{(0)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x^{(k)} \\ \Delta y^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin(x^{(k)} - 0,5) - y^{(k)} - 1,5 \\ 2x^{(k)} - \cos y^{(k)} - 0,6 \end{bmatrix}.$$

Результаты вычислений помещены в табл. 4.

Таблица 4

k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$\Delta x^{(k)}$	$\Delta y^{(k)}$
0	0,13	-1,8	0,059424	-0,00621
1	0,189424	-1,80621	-0,00436	-0,00346
2	0,185062	-1,80967	-0,00229	-0,00222
3	0,182773	-1,81189	-0,00147	-0,00141
4	0,181304	-1,8133	-0,00094	-0,0009
5	0,180369	-1,8142		